SEL Laboratoire CARRON

Protocole de recueil pour coproculture

- Recueillir environ 3 g (petite noix) de selles fraîches dans un pot stérile opaque, propre et à usage unique (fourni par le laboratoire)
- Rapporter l'échantillon rapidement au laboratoire :
 - Selles liquides et séro-sanglantes :
 - dans les 30 minutes si conservées à température ambiante
 - dans les 12 heures si conservées à 4°C
 - Selles semi-liquides : 60 minutes à température ambiante
 - Selles formées : 12 heures à 4° (frigo)
- Fournir les renseignements cliniques

Rem : en cas de parasitologie des selles effectuée en même temps, utiliser un pot stérile **transparent**

Laboratoire Carron – Ref : 21-SE-PRE-7ENR-033-01

SEL Laboratoire CARRON

Protocole de recueil pour coproculture

- Recueillir environ 3 g (petite noix) de selles fraîches dans un pot stérile opaque, propre et à usage unique (fourni par le laboratoire)
- Rapporter l'échantillon rapidement au laboratoire :
 - Selles liquides et séro-sanglantes :
 - dans les 30 minutes si conservées à température ambiante
 - dans les 12 heures si conservées à 4°C
 - Selles semi-liquides : 60 minutes à température ambiante
 - Selles formées : 12 heures à 4° (frigo)
- Fournir les renseignements cliniques

Rem : en cas de parasitologie des selles effectuée en même temps, utiliser un pot stérile **transparent**

Laboratoire Carron – Ref : 21-SE-PRE-7ENR-033-01

SEL Laboratoire CARRON

Protocole de recueil pour coproculture

- Recueillir environ 3 g (petite noix) de selles fraîches dans un pot stérile opaque, propre et à usage unique (fourni par le laboratoire)
- Rapporter l'échantillon rapidement au laboratoire :
 - Selles liquides et séro-sanglantes :
 - dans les 30 minutes si conservées à température ambiante
 - dans les 12 heures si conservées à 4°C
 - Selles semi-liquides : 60 minutes à température ambiante
 - Selles formées : 12 heures à 4° (frigo)
- Fournir les renseignements cliniques

Rem : en cas de parasitologie des selles effectuée en même temps, utiliser un pot stérile **transparent**

Laboratoire Carron – Ref : 21-SE-PRE-7ENR-033-01

SEL Laboratoire CARRON

Protocole de recueil pour coproculture

- Recueillir environ 3 g (petite noix) de selles fraîches dans un pot stérile opaque, propre et à usage unique (fourni par le laboratoire)
- Rapporter l'échantillon rapidement au laboratoire :
 - Selles liquides et séro-sanglantes :
 - dans les 30 minutes si conservées à température ambiante
 - dans les 12 heures si conservées à 4°C
 - Selles semi-liquides : 60 minutes à température ambiante
 - Selles formées : 12 heures à 4° (frigo)
- Fournir les renseignements cliniques

Rem : en cas de parasitologie des selles effectuée en même temps, utiliser un pot stérile **transparent**

Laboratoire Carron – Ref : 21-SE-PRE-7ENR-033-01